

所属リンパ節にサルコイド反応を認めた食道癌の1切除例

山村 真弘, 平井 敏弘, 松本 英男, 平林 葉子, 長塚 良介,
村上 陽昭, 窪田 寿子, 東田 正陽, 河邊由貴子, 岡 保夫,
奥村 英雄, 伊木 勝道, 浦上 淳, 山下 和城, 角田 司,
秋山 隆*

症例は71歳, 男性. 2003年11月, 嚥下時痛を主訴に当院受診. 食道造影, 内視鏡検査にて胸部中部食道に全周性の狭窄認め, 2型の食道癌と診断された. 術前の胸部CTにて気管周囲リンパ節の腫脹を認め, 転移が疑われた. 12月, 食道亜全摘と2群リンパ節廓清術を行い, 胃管を用いて胸骨後経路で再建した. 病理組織検査では中分化型扁平上皮癌で, pT3, ly2, v1, pN2 (2a), stageIIIであった. 郭清リンパ節ではNo.2にのみ転移を認めたが, 腫大したリンパ節のほとんどに壊死を伴わない類上皮細胞からなる肉芽腫を認めた. 術後サルコイドーシスの検索を行ったが, 胸部X-p異常, 眼病変, 皮膚病変, 表在リンパ節腫脹は認めず, 食道癌に伴うサルコイド反応と診断した. 本症例では術前所属リンパ節の転移が疑われたが, そのほとんどはサルコイド反応による腫大であったこと, またNo.2リンパ節では転移とサルコイド反応がともにみられたことより術前画像診断による判断は困難と考えられた.

(平成19年11月26日受理)

A Resected Case of Esophageal Cancer Associated with a Sarcoid Reaction in Regional Lymph Nodes

Masahiro YAMAMURA, Toshihiro HIRAI, Hideo MATSUMOTO,
Yoko HIRABAYASHI, Ryosuke NAGATSUKA, Haruaki MURAKAMI,
Hisako KUBOTA, Masaharu HIGASHIDA, Yukiko KAWABE,
Yasuo OKA, Hideo OKUMURA, Katsumichi IKI, Atsushi URAKAMI,
Kazuki YAMASHITA, Tsukasa TSUNODA, Takashi AKIYAMA*

A 71-year-old man visited our hospital complaining of swallowing pain in November 2003. A barium esophagram and endoscopic examination revealed annular stenosis of the wall of the middle portion of the esophagus and a diagnosis of type 2 advanced esophageal cancer was made. Preoperative chest computed tomography showed regional lymph nodes swollen and lymph node metastasis was suspected. Subtotal excision of the esophagus was carried out along with two-field lymph node dissection and anastomosis between the stomach tube and cervical esophagus through posterior sternum route in December.

川崎医科大学 消化器外科
〒701-0192 倉敷市松島577

Division of Gastroenterology, Department of Surgery, Kawasaki Medical School : 577 Matsushima, Kurashiki, Okayama, 701-0192 Japan
Department of Pathology

* 同 病理学教室
e-mail address : yamamura@med.kawasaki-m.ac.jp

